

**Method for synthesis of (2S,3aS,7aS)-1-(S)-alanyl-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid derivatives and use in the synthesis of perindopril****Publication number:** EP1256590**Publication date:** 2002-11-13**Inventor:** MEZEI TIBOR (HU); PORCS-MAKKAY MARTA (HU);  
SIMIG GYULA (HU)**Applicant:** SERVIER S A LAB (FR)**Classification:****- International:** C07B61/00; C07K5/02; C07K5/06; C07B61/00;  
C07K5/00; (IPC 1-7): C07K5/02**- European:** C07K5/02H1A1; C07K5/06A1H1**Application number:** EP20020291853 20020723**Priority number(s):** FR20010009839 20010724**Also published as:** WO03016336 (A1)  
 US7060842 (B2)  
 US2004198988 (A1)  
 MXP04000443 (A)  
 FR2827680 (A1)

more &gt;&gt;

**Cited documents:** EP0049658  
 EP0308341  
 WO0158868  
 WO0156972  
 WO0156353

more &gt;&gt;

[Report a data error here](#)**Abstract of EP1256590**

Process for industrial synthesis of (2S, 3aS, 7aS)-1-(S) alanyl octahydro-2-carboxylic acid derivatives (I) by reaction of alanine derivative (VI) and ester derivative (V) and catalytic hydrogenation. Process for industrial synthesis of (2S, 3aS, 7aS)-1-(S) alanyl octahydro-2-carboxylic acid derivatives of formula (I) comprises reaction of an ester of formula (V) with an alanine of formula (VI) in an organic solvent optionally in the presence of less than 0.6 mole per mole (V) of 1-hydroxybenzotriazole and in the presence of 1-1.2 mole of dicyclohexylcarbodiimide and 1-1.2 mole of triethylamine per mole of (V) at 20-50 degrees C to give a compound of formula (VII) which is then hydrogenated at 1-40 bars and 30-70 degrees C in the presence of a catalyst, preferably rhodium on charcoal or platinum dioxide, to form (I). R1 = H, 1-8C alkyl, or benzyl, and R2 = amino protecting group. An independent claim is also included for a process for the synthesis of perindopril starting from (I).

Data supplied from the [esp@cenet](mailto:esp@cenet) database - Worldwide



## DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:

13.11.2002 Bulletin 2002/46

(51) Int Cl.7: C07K 5/02

(21) Numéro de dépôt: 02291853.6

(22) Date de dépôt: 23.07.2002

(84) Etats contractants désignés:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR  
IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR

Etats d'extension désignés:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorité: 24.07.2001 FR 0109839

(71) Demandeur: Les Laboratoires Servier S.A.  
92200 Neuilly sur Seine (FR)

(72) Inventeurs:


- Mezel, Tibor  
1221 Budapest (HU)
- Porcs-Makkay, Marta  
2013 Pomaz (HU)
- Simig, Gyula  
1225 Budapest (HU)

(54) **Nouveau procédé de synthèse de dérivés de l'acide (2S, 3aS, 7aS)-1-(S)-alanyl-octahydro-1H-indole-2-carboxylique et application à la synthèse du perindopril**



(57) Procédé de synthèse industrielle des composés de formule (I) :

dans laquelle  $R_1$  représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle ou benzyle, et  $R_2$  représente un groupement protecteur de la fonction amino.

Application à la synthèse du perindopril et de ses sels pharmaceutiquement acceptables.









**[0005]** La demanderesse a présentement mis au point un nouveau procédé de synthèse industrielle qui conduit, sans nécessiter de purification laborieuse, au perindopril avec une pureté qui est compatible avec son utilisation comme principe actif pharmaceutique, et qui est notamment totalement exempt des impuretés de formules (III) et (IV).

**[0006]** De plus, ce procédé utilise comme source de chiralité l'alanine, matière première naturelle et donc peu coûteuse.


**[0007]** Plus spécifiquement, la présente invention concerne un procédé de synthèse industrielle du composé de formule (I) :




dans laquelle  $R_1$  représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle ( $C_1-C_6$ ) linéaire ou ramifié ou benzyle, et  $R_2$  représente un groupement protecteur de la fonction amino, caractérisé en ce que l'on met en réaction l'ester de formule (V) :



dans laquelle  $R_1$  est tel que défini dans la formule (I), avec le dérivé de l'alanine de formule (VI) :




dans laquelle  $R_2$  est tel que défini dans la formule (I), dans un solvant organique tel que, par exemple, le tétrahydrofurane ou l'acétate d'éthyle, en l'absence de 1-hydroxy-benzotriazole ou en présence d'une quantité de 1-hydroxybenzotriazole inférieure à 0,6 mole par mole de composé de formule (V) utilisé, en présence d'une quantité de dicyclohexylcarbodiimide comprise entre 1 et 1,2 mole par mole de composé de formule (V) utilisé, et d'une quantité de triéthylamine comprise entre 1 et 1,2 mole par mole de composé de formule (V) utilisé, à une température comprise entre 20 et 50°C, pour conduire après isolement puis recristallisation au composé de formule (VII) :




dans laquelle  $R_1$  et  $R_2$  sont tels que définis précédemment, que l'on hydrogène en présence d'un catalyseur tel que, par exemple, Pd/C, Rh/C, Pt/C, Ni/C ou PtO<sub>2</sub>, sous une pression d'hydrogène comprise entre 1 et 40 bars, à une température comprise entre 30 et 70°C, pour conduire au composé de formule (I).

**[0008]** Le composé de formule (I) ainsi obtenu est ensuite soumis, le cas échéant, à une réaction de déprotection des fonctions acide et amine, suivie d'une réaction de couplage, soit avec le 2-oxo-pentanoate d'éthyle dans des conditions d'amination réductrice, soit avec un composé de formule (XII) :




dans laquelle X représente un groupement partant chiral parmi atome d'halogène, —O—SO<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> et




pour conduire au périndopril optiquement pur, que l'on transforme, si on le souhaite, en un sel pharmaceutiquement acceptable tel que le sel de tert-butylamine.

**[0009]** Ce procédé est particulièrement intéressant pour les raisons suivantes :

- Le couplage en milieu alcalin de l'ester benzylique de l'acide (2S, 3aS, 7aS)-octahydroindole 2-carboxylique de formule (VIII) :





avec le composé de formule (IX) a été décrit dans le brevet EP 0 308 341.



Cependant, l'ester benzylique du perindopril ainsi obtenu est contaminé par de nombreux produits secondaires.

En particulier, il contient dans des proportions importantes (5 à 15 %) les impuretés de formules (X) et (XI) résultant de la réaction du produit de couplage avec la dicyclohexylcarbodiimide. Impuretés qui après débenzylation conduisent aux impuretés de formules (III) et (IV).



- La Demanderesse a trouvé que la réaction de couplage du composé de formule (V) avec le composé de formule (VI) conduisait à un composé de formule (VII) totalement exempt des impuretés résultant de la réaction du produit de couplage avec la dicyclohexylcarbodiimide.
- Le composé de formule (VII) ainsi obtenu conduit au perindopril avec une pureté bien meilleure, et qui est notamment totalement exempt des impuretés de formules (III) et (IV).
- De plus, la Demanderesse a trouvé que le composé intermédiaire de formule (VII) pouvait être obtenu sous une forme cristalline aisément purifiable.

Sa transformation selon le procédé de l'invention conduit ainsi au composé de formule (I) avec une pureté excellente.

**[0010]** Les exemples ci-dessous illustrent l'invention, mais ne la limitent en aucune façon.

**Exemple 1 :** (2S)-1-((2S)-2-((Tert-butyloxycarbonyl)-amino)-propionyl)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylate de méthyle :

[0011] Dans un réacteur sous agitation sont introduits 2,13 kg de (2S)-2,3-dihydroindole 2-carboxylate de méthyle, 1 kg de triéthylamine, 30 l de tétrahydrofurane puis, après 10 mn d'agitation à température ambiante, 1,9 kg de N-[tert-butyloxycarbonyl]-L-alanine, et 2 kg de dicyclohexylcarbodiimide. Le mélange hétérogène est ensuite agité à température ambiante pendant 6 heures, puis il est refroidi à 0°C et filtré.

Le filtrat est ensuite lavé, puis recristallisé dans un mélange hexane/acétate d'éthyle 10/1 pour conduire au produit attendu avec un rendement de 81% et une pureté chimique de 98%.

Point de fusion : 130-131°C

[0012]

Microanalyse élémentaire :			
	C%	H%	N%
calculé	62,05	6,94	8,04
trouvé	61,80	6,94	8,00

**Exemple 2 :** (2S, 3aS, 7aS)-1-((2S)-2-((Tert-butyloxycarbonyl)-amino)-propionyl)-octahydro-1H-indole-2-carboxylate de méthyle | méthode 1 :

[0013] Le résidu obtenu dans l'exemple 1 (1 kg) est mis en solution dans le méthanol et transféré dans un hydrogénéateur, puis 0,10 kg de rhodium sur charbon à 5% sont ajoutés.

Le mélange est ensuite hydrogéné sous une pression de 30 bars, à une température de 60°C, jusqu'à absorption de la quantité théorique d'hydrogène.

Après filtration du catalyseur, le solvant est évaporé pour conduire au produit attendu avec un rendement de 90% et une pureté chimique de 98%.

**Exemple 3 :** (2S, 3aS, 7aS)-1-((2S)-2-((Tert-butyloxycarbonyl)-amino)-propionyl)-octahydro-1H-indole-2-carboxylate de méthyle | méthode 2 :


[0014] Le résidu obtenu dans l'exemple 1 (1 kg) est mis en solution dans l'acide acétique et transféré dans un hydrogénéateur, puis 0,10 kg de dioxyde de platine sont ajoutés.

Le mélange est ensuite hydrogéné sous une pression de 10 bars, à une température de 40°C, jusqu'à absorption de la quantité théorique d'hydrogène.


Après filtration du catalyseur, le solvant est évaporé pour conduire au produit attendu avec un rendement de 90% et une pureté chimique de 98%.

## Revendications


1. Procédé de synthèse industrielle du composé de formule (I)




dans laquelle  $R_1$  représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle ( $C_1-C_8$ ) linéaire ou ramifié ou benzyle, et  $R_2$  représente un groupement protecteur de la fonction amino, caractérisé en ce que l'on met en réaction l'ester de formule (V) :



dans laquelle  $R_1$  est tel que défini dans la formule (I), avec le dérivé de l'alanine de formule (VI) :



dans laquelle  $R_2$  est tel que défini dans la formule (I), dans un solvant organique tel que, par exemple, le tétrahydrofurane ou l'acétate d'éthyle, en l'absence de 1-hydroxybenzotriazole ou en présence d'une quantité de 1-hydroxybenzotriazole inférieure à 0,6 mole par mole de composé de formule (V) utilisé, en présence d'une quantité de dicyclohexylcarbodiimide comprise entre 1 et 1,2 mole par mole de composé de formule (V) utilisé, et d'une quantité de triéthylamine comprise entre 1 et 1,2 mole par mole de composé de formule (V) utilisé, à une température comprise entre 20 et 50°C, pour conduire après isolement puis recristallisation au composé de formule (VII) :





dans laquelle  $R_1$  et  $R_2$  sont tels que définis précédemment, que l'on hydrogène en présence d'un catalyseur tel que, par exemple, Pd/C, Rh/C, Pt/C, Ni/C ou PtO<sub>2</sub>, sous une pression d'hydrogène comprise entre 1 et 40 bars, à une température comprise entre 30 et 70°C, pour conduire au composé de formule (I).

2. Procédé de synthèse du composé de formule (I) selon la revendication 1 caractérisé en ce que le catalyseur utilisé dans l'étape d'hydrogénation est le rhodium sur charbon.
3. Procédé de synthèse du composé de formule (I) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le catalyseur utilisé dans l'étape d'hydrogénation est le dioxyde de platine.
4. Procédé de synthèse du composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que  $R_1$  représente le groupement méthyle.



5. Procédé de synthèse du perindopril ou de ses sels pharmaceutiquement acceptables à partir du composé de formule (I), caractérisé en ce que le composé de formule (I) est obtenu par le procédé de synthèse selon l'une quelconque des revendications 1 à 4.

6. Procédé de synthèse selon la revendication 5, caractérisé en ce que le perindopril obtenu est exempt des impuretés de formules (III) et (IV).





Office européen  
des brevets

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande  
EP 02 29 1853

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
D,Y	EP 0 049 658 A (ADIR) 14 avril 1982 (1982-04-14) * page 16 - page 18; revendications *	1,5	C07K5/02
D,Y	EP 0 308 341 A (ADIR) 22 mars 1989 (1989-03-22) * page 8 - page 9; revendications *	1,5	
A	VINCENT M ET AL: "SYNTHESIS AND ACE INHIBITORY ACTIVITY OF THE STEREOISOMERS OF PERINDOPRIL (S 9490) AND PERINDOPRILATE (S 9780)" DRUG DESIGN AND DISCOVERY, HARWOOD ACADEMIC PUBLISHERS GMBH, XX, vol. 9, no. 1, 1992, pages 11-28, XP000885876 ISSN: 1055-9612 * page 13, schéma II; page 27 *	1-6	
P,A	WO 01 58868 A (ADIR ;LANGLOIS PASCAL (FR); TURBE HUGUES (FR)) 16 août 2001 (2001-08-16) * revendications *	1-6	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
P,A	WO 01 56972 A (ADIR ;RENAUD ALAIN (FR); SOUVIE JEAN CLAUDE (FR)) 9 août 2001 (2001-08-09) * page 1; revendication 6 *	1,6	C07K C07D
P,A	WO 01 56353 A (ADIR ;SOUVIE JEAN CLAUDE (FR)) 9 août 2001 (2001-08-09) * page 1; revendication 6 *	1,6	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche <b>LA HAYE</b>		Date d'achèvement de la recherche <b>16 septembre 2002</b>	Examineur <b>Chouly, J</b>
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date du dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons A : arriéré-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arriéré-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE  
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 02 29 1853

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.  
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du  
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

16-09-2002

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0049658	A	14-04-1982	FR 2491469 A1	09-04-1982
			FR 2503155 A2	08-10-1982
			AT 7910 T	15-06-1984
			AU 542611 B2	28-02-1985
			AU 7594981 A	08-04-1982
			DD 201783 A5	10-08-1983
			DE 3164201 D1	19-07-1984
			DK 434381 A ,B,	03-04-1982
			EG 15361 A	30-04-1987
			EP 0049658 A1	14-04-1982
			ES 505999 D0	16-04-1983
			ES 8305723 A1	16-07-1983
			FI 813034 A ,B,	03-04-1982
			GR 75016 A1	12-07-1984
			HU 185147 B	28-12-1984
			IE 51821 B1	01-04-1987
			IL 63940 A	30-06-1985
			JP 1032239 B	29-06-1989
			JP 1712706 C	27-11-1992
			JP 57091974 A	08-06-1982
			KR 8601875 B1	24-10-1986
			LT 2504 R3	15-02-1994
			LU 88262 A9	03-02-1994
			LV 5484 A3	10-03-1994
			MX 6654 E	01-10-1985
			NO 813339 A ,B,	05-04-1982
			NZ 198535 A	28-09-1984
			OA 6914 A	31-05-1983
			PH 17516 A	13-09-1984
			PT 73755 A ,B	01-11-1981
			SU 1153827 A3	30-04-1985
			US 4508729 A	02-04-1985
			US 4565819 A	21-01-1986
			US 4644008 A	17-02-1987
			US 4616029 A	07-10-1986
			US 4616031 A	07-10-1986
			US 4616030 A	07-10-1986
			YU 236681 A1	30-09-1983
			ZA 8106844 A	29-09-1982
EP 0308341	A	22-03-1989	FR 2620709 A1	24-03-1989
			AT 59047 T	15-12-1990
			AU 2236288 A	23-03-1989
			CA 1336348 A1	18-07-1995
			CA 1338015 A1	30-01-1996
			DE 3861275 D1	24-01-1991

EPC FORM P/80

Pour tout renseignement concernant cette annexe voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE  
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 02 29 1853

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.  
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du  
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

16-09-2002

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0308341	A		DK 515188 A	18-03-1989
			EP 0308341 A1	22-03-1989
			GR 3001539 T3	23-11-1992
			IE 61453 B	02-11-1994
			JP 1110696 A	27-04-1989
			JP 1831914 C	29-03-1994
			JP 5043717 B	02-07-1993
			NZ 226224 A	26-09-1990
			QA 8915 A	31-10-1989
			PT 88527 A , B	01-10-1988
			US 4914214 A	03-04-1990
			ZA 8806932 A	30-05-1989
WO 0158868	A	16-08-2001	FR 2807431 A1	12-10-2001
			AU 4847001 A	20-08-2001
			WO 0158868 A1	16-08-2001
			PL 346555 A1	10-09-2001
WO 0156972	A	09-08-2001	FR 2807430 A1	12-10-2001
			AU 5046701 A	14-08-2001
			WO 0156972 A1	09-08-2001
			HU 0101337 A2	28-11-2001
			PL 346553 A1	10-09-2001
WO 0156353	A	09-08-2001	FR 2807037 A1	05-10-2001
			AU 4843301 A	14-08-2001
			WO 0156353 A2	09-08-2001
			HU 0101335 A2	28-11-2001
			PL 346554 A1	10-09-2001

EPO FORM P0462

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82